

光合成に役立つケイ酸 地力増強の腐植 共生を促進する微生物

ハイアップ

NET
20kg

ミネラル

腐植

HIGH-UP

芝生の生育には3つの条件が必要

1. 土壌に必要なバランスを保持するミネラル成分
2. 土壌のPHを改善し肥沃度を増加させる腐植成分
3. 土壌の悪玉菌を善玉菌に変移し改善促進



サン化研株式会社

本社

〒589-0023 大阪府大阪狭山市大野台4-26-8
TEL : 072-366-2012 / FAX : 072-367-3533

www.sunkaken.co.jp

光合成に役立つケイ酸
地力増強の腐植
共生を促進する微生物

ハイアツプ

NET
20kg

成分分析例(%)

チツソ	リン酸	カリ	ケイ酸	苦土	鉄	石灰	マンガン	腐植
3%	2%	1%	30%	6%	5%	5%	3%	45%

PH. 6.0~6.5 CEC. 75me

〈成分合計 100%〉

含有有機付帯微生物・酵素

●微生物 … 好熱菌・ホウジョウ 3.4×10^8

短杵菌・バチルスナットウ 7.5×10^8

●酵素 … プロテナーゼ、アミラーゼ、カタラーゼ、セルラーゼ、キナーゼ
光合成5倍酵素(Lsi1)

特徴

- 1 芝生の養生管理に使いやすい粒型(微細粒、普通粒)で製品化されています。
- 2 芝生の光合成作用を助長する酵素(細胞膜貫通型酵素(Lsi1))を有しております。
- 3 善玉菌でありますバチルスナットウ菌 7.5×10^8 、好熱菌(ホウジョウ菌) 3.4×10^8 の力で、芝生のサッチを分解し、又悪玉菌抑制効果を発揮します。
- 4 含有ケイ酸は芝生を頑健にしてくれます。
- 5 含有腐植が芝生を健全に生育させ、又根群を成長させてくれます。

施肥基準

ゴルフ場 芝地施肥

コース内	施用量(1回当り)	施肥期
グリーンG	30~40g/m ²	春・夏・秋期
ティーG	30~40g/m ²	適期施用
フェアウェイG	30~60g/m ²	春・秋期
ラフーG	20~30g/m ²	適期施用